

# CHRYSANTHEME DES JARDINS.

## **Composées.**

### ***Chrysanthemum coronarium* L.**

Du Levant. Annuelle; tige de 0m.65; feuilles amplexicaules; en juillet - septembre, capitules solitaires, simples ou doubles, à fleurs blanches ou jaunes. Tout terrain ; mieux terre franche légère; multiplication de graines.

Cette plante, cultivée en Europe pour la décoration des jardins, est potagère en Chine. Elle faisait partie des graines de cette nature rapportées par le capitaine Geoffroy. Sa saveur nous a paru désagréable, et le défaut d'indications sur le mode de son emploi ne nous permet pas d'en proposer la culture. Nous consignons le fait comme un renseignement de plus sur les espèces potagères des chinois.

### ***Chrysanthemum carinatum* Sch.**

Chrysanthème caréné

Du Maroc. Annuelle, tiges de 0m.35, diffuses; feuilles bipinnatifides, charnues, à odeur de Géranium. En juillet - septembre, fleurs en gros capitules, celles du disque brunes, celles des rayons blanches, mais jaunes à leur base. Elles s'étalent au soleil, et se couchent en dehors des qu'il disparaît. Semer en pots sur couche pour repiquer ensuite.

### ***Chrysanthemum frutescens* L.**

Chrysanthème frutescent.

Des Canaries. Arbrisseau de 0m.70 à 1m. ; Feuilles oblongues, pinnatifides, capitules à rayons blancs, portés sur de longs pédoncules, se succédant une grande partie de l'année.

Multiplication de boutures et de graines semées, au printemps, sur couche et sous cloche ou de boutures pendant tout l'été, en plein air et à l'ombre. Terre franche légère. On peut le planter en pleine terre l'été, le rentrer en orangerie, où il continue de fleurir abondamment tout l'hiver.

C. fr. flore luteo, var. à fleur jaune, plus jolie. Les *C. pinnatifidum*, L., *C. broussonetii*, Pers. , *C. foeniculaceum*, Willd. , et *C. tanacetifolium*, H. P., sont également des arbrisseaux d'orangerie et se cultivent de même.

### ***Pyrethrum officinale* D.G.**

Anthemis pyrethrum, L.

Pyrèthre officinal.

Du Caucase. Tiges courtes et couchées; feuilles pennées ; en juin et juillet, capitules grands, à 20 rayons blancs en dessus et rosés en dessous, et à disque jaune. Culture en pot et rentrer en orangerie.

### ***Pyrethrum tanacetum* Dec.**

Balsamita suaveolens Desf. ; Tanacetum balsamita, L.

Pyrèthre à feuilles de tanaïsie, menthe-coq.

Vivace. De la France mer. Tiges de 0m.70 à 1m. , blanchâtres; feuilles ovales, dentées, grisâtres; en août, capitules jaunes, petits, nombreux, formant un large corymbe. Toute la plante répand une odeur aromatique lorsqu'on y touche. Multiplication de drageons ; exposition au soleil ; terre franche.

### ***Pyrethrum inodorum* Hort.**

Pyrèthre sans odeur.

Vivace et de pleine terre; touffe arrondie; tiges nombreuses, de 0m.04 ; feuilles multifides; en juin et juillet, fleurs réunies en capitules nombreux, doubles, blancs et d'un bel effet. Multiplication par éclats et de boutures en août.

### ***Pyrethrum serotinum Willd.***

*Chrysanthemum serotinum* L.

Pyrèthre tardif.

De l'Amérique septentrionale Vivace ; formant de grosses touffes de 1m.30 à 1m.60, terminées en sept. Par de gros et nombreux capitules de fleurs blanches, propres à la décoration des grands parterres et des jardins paysagers. Toute terre. Multiplication de graines et d'éclats.

### ***Pyrethrum carneum Biebr.***

*Chrysanthemum carneum* Steud.

Pyrèthre carné.

Du Caucase. Vivace; feuilles découpées; en mai et juin, fleurs rosé pâle.

### ***Pyrethrum roseum Biebr.***

*Chrysanthemum roseum* Adans.

Pyrèthre rosé.

Du même pays et ressemblant beaucoup à la précédente; mais ses feuilles sont plus finement découpées et ses fleurs plus rosées. Multiplication de graines au printemps et d'éclats en automne.

### ***Pyrethrum grandiflorum H.P.***

*Anthemis grandiflora*. *Chrysanthemum indicum* L.

Pyrèthre à grandes fleurs, Chrysanthème des Indes.

De la Chine. Belle plante vivace, dont les tiges, de 0m.70 à 1m.30 et garnies de feuilles diversement découpées se terminent par plusieurs capitules de fleurs larges de 0m.03 à 0m.11, pourpre foncé dans la plus ancienne espèce, mais ornées de toutes les couleurs dans les nombreuses variétés qu'on a obtenues. Ces belles plantes fleurissent tard, et l'hiver les surprend dans toute leur beauté; on est obligé d'en cultiver en pot, que l'on rentre en orangerie, où, arrangées sur un gradin, elles forment un magnifique tapis jusqu'à Noël; celles qui restent en pleine terre craignent les grands froids. Elles ont besoin d'une bonne terre et de beaucoup d'eau. On les multiplie facilement d'éclats et de boutures; on doit en faire de nouveaux pieds chaque année, et supprimer ceux qui ont plus de 3 ans, parce qu'ils usent trop la terre. Les semis fleurissent en grande partie la même année. On a essayé inutilement de les forcer sous châssis au printemps, pour les faire fleurir en septembre; il leur faut absolument de l'air et du soleil. Elles ne fleurissent même, que lorsque la température de l'automne est descendue à un certain degré. Si l'on coupe des rameaux quand les boutons à fleurs paraissent, et qu'on les bouture à l'étouffée, on obtient de petites plantes propres à mettre sur la cheminée d'un appartement. Plusieurs jardiniers ont réussi à faire fleurir ces plantes au printemps.

Chaque graine de chrysanthème donnant une variété différente, il n'est plus possible de les nommer toutes ou de les décrire. M. Haworth, de la Société Horticulturale de Londres, qui a beaucoup étudié ce genre et les variétés de son temps, a pu les réunir en six groupes qui comprenaient non-seulement toutes les variétés connues, mais où devaient se ranger toutes celles à venir: idée heureuse que nous adoptons; car, en considérant les variétés qui se sont produites depuis vingt ans, on reconnaît qu'elles peuvent toutes entrer dans l'une des six sections établies par M. Haworth. En voici les titres:

Section I capitules renonculacés ou imitant une Renoncule double

Section II capitules renonculacés dont les pétales sont frisés

Section III capitules ressemblant à une Reine-Marguerite, ayant souvent un disque brillant

Section IV capitules ayant la forme et la grandeur de ceux du souci double

Section V capitules pleins, imitant un gland huppé, pendant (Les plantes de cette section sont hautes ou très hautes; leurs capitules, grands, doubles, pendants d'une manière plus ou moins sensible, ont les corolles ordinairement longues, en tuyau, et leur ensemble a souvent la forme d'un gland huppé de cordon de sonnette ou de rideau)

Section VI capitules semi-doubles, huppés, souvent pendants, dont les corolles sont allongées en tuyaux grêles.

### ***Tanacetum vulgare L.***

Tanaisie commune

Indigène. Aromatique ; d'un bel effet dans les jardins paysagers. Tiges droites, très feuillées, de 1m. à 1m. 30; feuilles bipennées ; en août, capitules d'un beau jaune, disposés en corymbe. Multiplication de drageons ; exposition au soleil ; terre franche.

***Tanacetum boreale Fisch.***

Tanaisie boréale

De Sibérie. Vivace ; même port que la précédente ; feuilles simplement pennées, à folioles profondément dentées ; capitules jaunes, plus gros que dans la première espèce, et produisant plus d'effet. Même culture.