Percer le mystère de ces morts

Créée en janvier, l'association Sa vie milite pour développer les programmes de recherche sur ces décès.

Ile a vécu ce que tout parent redoute. Un soir, avant de se coucher, la Nantaise Sophie Foucat fait le tour des chambres pour vérifier que tout va bien lorsqu'elle découvre sa fille Sixtine, quatre mois et demi, inanimée dans son lit.

Le CHU de Nantes constate le décès du bébé. Une autopsie est pratiquée, des tests aussi mais aucune pathologie infectieuse, malformation ou trouble cardiaque n'apparaît. Le diagnostic d'élimination des causes du décès ne révèle strictement rien. « Là, j'ai entendu la pire phrase de

Lancer un programme de recherche et des dépistages

ma vie lorsque le médecin m'a annoncée qu'en l'état actuel des connaissances, il ne pouvait expliquer la mort de ma fille», confie Sophie Foucat. La maman avait pourtant pris toutes les précautions d'usage.

Position ventrale

En pareil mort subite inexpliquée, le corps médical pose le diagnostic de « mort inattendue du nourrisson », plus communésensiblement chuté avec ver l'origine car ce sont des du nourrisson.



Sophie Foucat a créé l'association Sa vie dans l'espoir de faire progresser la recherche sur la mort subite du nourrisson.

France à 400 aujourd'hui). n'en est pas pour autant la ministre de la Santé et au cause du décès.

En janvier, Sophie Foucat a Ses attentes ? Un programment nommée « mort su- de « dynamiser la recherche et le dépistage obligatoire bite du nourrisson ». À sur ce symptome. Il faut se de deux autres maladies partir de 1995, les cas ont donner les moyens de trou-associées à la mort subite

entre autres la contestation familles entières qui sont de la position ventrale lors plongées dans le désespoir. » du couchage du bébé Fort du soutien de 680 ad-(d'environ 1 750 par an en hérents, elle a adressé des courriers au député-maire Ce facteur de risque avéré Jean-Marc Ayrault et à la président de la République. créé l'association Sa vie afin me national de recherche

Briser le tabou

Le syndrome du QT long et le déficit en Mcad, dépistables par une échographie cardiaque du bébé et une prise de sang, pourraient expliquer 20 % des morts subites du nourrison. « La mort subite du nourrisson demeure tabou », déplore Sophie Foucat. C'est pour ouvrir la discussion et impulser la recherche que l'association organise ce soir un concert à Couëron.

Marilyne Gautronneau

Vendredi 2 juillet à Couëron, l'association Sa Vie tiendra un stand lors du concert rock des Koperniks. Entrée libre, Le magasin à huile, à partir de 20 h. Contact « Sa vie »: 06 13 57 75 05 et par mail contact@sa-vie.org

REPÈRES

7 à 15 cas

De morts subites du nourrisson en Loire-Atlantique et Vendée chaque année, selon les données du CHU, centre référent pour les deux départements.

Pic à 4 mois

Elles surviennent surtout chez les nourissons de moins de 6 mois, avec un pic autour de 4 mois.

Risques

La position ventrale de couchage multiplie le risque de mort subite par 13. Le tabagisme passif pendant la grossesse par 5. Plus d'infos sur www.has.fr

L'EXPERT



Georges Picherot, chef du service pédiatrique au CHU de Nantes

« La sérotonine est la plus reconnue »

vaise régulation du système nerveux central assurée par la sérotonine est pour l'heure privilégiée. Cette molécule pourrait être à l'origine de transmetteurs anormaux qui modifient le rythme respiratoire et cardiaque du

Études. « L'hypothèse d'une mau- nourrisson. C'est la piste qu'a découverte une équipe de l'université de Strasbourg en début d'année. Mais cette hypothèse n'a pas été, à ce jour, validée par d'autres études. Il faut que des études épidémiologiques soient menées.»